โรคพิษสุนัขบ้า

เกิดจากเรบี่สไวรัส (Rabies virus) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อจน
ตาย 10

สัตว์กลุ่มเสี่ยงเป็นโรค

- สุนัข-แมว ที่ถูกสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด
- สุนัข-แมว จรจัดในพื้นที่เกิดโรค
- สุนัข-แมว ที่เลี้ยงร่วมกันกับสุนัขที่เป็นโรคพิษส
- สุนัข-แมว ที่ไม่ฉีดวัคซีน หรือไม่ทราบประวัติวัค



ดูอย่างไรว่าสัตว์ติดโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก
นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด เก็บตัว หวาดระแวง ม่านตาขยาย

ระยะตื่นเต้น
กระวนกระวาย กัดไม่เลือก เห่าหอน

ระยะอัมพาต
น้ำลายไหล คางห้อยตก ล้มลง ตาย

คาดา
5ย.
กันสุนัขกัด

1 อย่าแหย่ — ทำให้สุนัขโกรธ

2 อย่าเหยียบ — หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ

3 อย่าแยก — สุนัขที่กัดกันด้วยมือเปล่า

4 อย่าหยิบ — อาหารที่สุนัขกำลังกิน

5 อย่ — กับสุนัขที่ไม่มี

คำแนะนำเมื่อถูกกัด-ข่วน-เลีย

ล้างแผล
ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้ง

ใส่ยา
เบตาดีน

กักหมา-แมว



คำแนะนำสำหรับผู้เลี้

ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

เลี้ยงในรั้วบ้าน
ออกนอกบ้านต้อง ใส่สายจูง